



►周志平醫生說，昔日胸骨凸出情況嚴重者，需要以外科手術矯正，現時可以用非手術方式矯形，減低風險。

六歲的鏗仔，和任何一位少年人一樣，愛運動，注重外形，然而一次游泳活動中，卻驚覺自己身體有點與別不同。

「當時一位泳池救生員突然跟我說話，指我的胸部……好像有點異常！我聽後都很愕然，從來沒有人對我說過這情況，我多次和同學去游泳，大家男孩子肉帛相見，他們都沒有說甚麼……」

當時，我只感到突然和錯愕……」鏗仔向記者說。

之後，他特別照鏡觀察自己的胸部，發覺的確比別人突出，

探，最後經朋友介紹到養和醫院

求醫，終發現有法可治。

「這裏的復康科醫生周志平

醫生，說有一種胸架可以矯正我

的胸骨，要每天二十四小時都戴

上，除了洗澡外，其餘時間，就

連睡覺時也要戴上，胸架才能發

揮最大效用，使我的胸骨能快點

回復正常！」鏗仔說。

他說的胸架，其實是一個胸廓造型架，由鋁合金及多種不同密度的塑膠製造，重約0.4公斤，獲美國食品及藥物管理局（FDA）註冊用於胸骨矯正治療。

負責診治鏗仔的養和醫院物理醫學及復康科部主任周志平醫生說，青少年於發育期間胸骨異常向外生長，致胸骨凸出（Pectus Carinatum），屬第二常見的胸壁後天畸形病症。根據美

國數字，每一千名青少年便有一是，鏗仔媽媽不服氣，自行再打



胸骨凸出
嚴重程度

少年發病 影響身形

骨科醫生經檢查後，確定是

胸骨發育異常造成，但沒有提供

特別治療方法，只說保持觀察就

是，鏗仔媽媽不服氣，自行再打

治小年雞胸



胸骨凸出
對體形的影響

青少年在發育時期，身形會長高，軀體會長出更多肌肉，然而有時發育會超出正常比例，其中一種胸骨發育異常，導致胸骨向前突出，俗稱「雞胸」的病症，就令不少青少年大受困擾，除了外觀上的「突出」外，嚴重者甚至會影響呼吸，引致胸痛及降低心肺功能等。

昔日要治療這種病症，需要剖開肋骨和胸骨，重新接駁來矯形。今天，可以用無創方式，利用胸骨塑型架，將生長異常的胸廓推回正軌，解決問題。

撰文：陳旭英 攝影：張文智 設計：霍明志 插圖：鍾國光

► 鏗仔佩戴胸廓造型架五個月，胸骨凸出情況已大為改善。

胸骨凸出 對體形的影響

- 1.高低膊
- 2.寒背
- 3.頸椎前傾
- 4.頭前傾
- 5.肩胛甲凸起

對健康影響

- 1.心肺功能削弱
- 2.呼吸不順，特別於運動時
- 3.胸痛
- 4.胸悶



位有胸骨凸出問題，以少男居多，男女患者比例約為四比一。由於胸骨異常凸出，像雞的胸部一樣，故俗稱「雞胸」，又稱「凸胸」，雖然在一般情況下並不構成生理問題，但在外觀上亦較難看，故對正值青春期的患者來說，可能會帶來心理成長及社交生活障礙。

這種在青春期病發，大多在十歲後開始發病的雞胸症，可以是胸前壁正中位置凸出、某邊胸骨特別凸出，或胸肋骨呈不規則地凸出。胸骨凸出後，逐漸會帶來其他問題，常見的有寒背、頸椎前傾、膊頭前傾及背胛骨凸起，主要是因為患者不想別人察覺胸骨突出問題，故下意識縮起肩膀及以寒背姿勢來掩飾，而久之令姿勢畸形；而高低膊及可能出現的脊柱側彎，亦常見於一邊胸骨凸出的患者。

梁永健解釋，由於胸廓造型架非常貼身，所以穿上外衣後也難以察覺，而患者穿上造型架時亦可以做輕量運動，包括一般學校體育課，不會影響正常生活。

「基本上這個造型架需二十四小時佩戴，除了洗澡時脫下外，其餘時間都應戴上。如需進行一些較劇烈的運動，例如出席陸運會或水運會等則宜脫下，以免妨礙呼吸。」梁永健說。

造型架所以能發揮效用，主要是因為青少年的肋骨尚未完全骨化，仍然柔軟，故有可塑性。如果患者在十歲以下，治療效果會更顯著。而治療期間，矯形師會密切監察治療進度，並相應調整造型架。如患者依從醫護人員指示穿戴，成功率達九成以上。

這種病症除了影響外觀，嚴重患者的肺部功能亦有機會受影響，「胸骨凸出會令胸腔變形，減少

肺部活動空間，有可能會導致呼吸不順、胸痛、胸悶、降低心肺功能等，病情嚴重的，更需要接受外科手術，切斷胸肋軟骨及切斷胸骨，重塑胸腔形狀，但當中難免涉及手術風險及留有疤痕。」周志平醫生說。

梁永健指出，要調適治療期間，及定期覆診，及校正胸廓鬆緊度。



胸部凸出影響心理

如果病況輕微，雖然未致產生生理問題，但對於患者心理上亦有一定影響。他們為了不顯露特殊的胸形，一般不敢露出上身或穿窄身衣服，所以游泳、打球、跳舞等一類運動，都會拒絕參與。

有時更可能怕尷尬而減少群體或戶外活動，影響社交。周志

平醫生特別指出，由於病發時正值青春期，如不及時處理，


部分患者需先進行胸腔X光或電腦掃描檢查，如懷疑心肺功能受影響，亦會進行心電圖及心臟超聲波等檢查，然後由矯形師為患者度身訂做胸廓造型架。

和醫院義肢矯形師梁永健說，胸廓造型架的治療原理是利用外在壓力，在凸出胸骨上加壓，令其變得害羞或內向，對青少年的整體心理健康和社交生活帶來長遠影響。

不但病情會惡化，患者亦有可能變得害羞或內向，對青少年的整體心理健康和社交生活帶來長遠影響。




▲ 周志平醫生出席記者會述青少年的胸骨凸出情況，及如何利用胸廓造型架矯正。



使用前

▲ 胸骨凸出患者，連帶肋骨也會變形，胸腔變得較窄。


▼ 矫形後，胸骨回復正常位置，肋骨也向兩邊拉闊，令胸腔回復寬闊。



使用後

全日佩戴效果最好

改善肌力及軟組織柔韌性




1. 造型架由鋁合金及不同密度塑膠物料製造，重量只為0.4公斤/0.8磅，輕巧耐用，易於清洗。
2. 纖薄貼身，病人容易自行穿戴。
3. 度身訂做，減少病人穿戴期間的不適感，亦不會妨礙女性胸部發育。
4. 安全可靠（獲美國食品及藥物管理局FDA註冊）。
5. 進行一般運動時亦可穿戴。
6. 效果快（於兩個月內有顯著效果）。

► 胸廓造型架的原理，是利用壓力將胸骨向內推，重回正常位置。

胸廓造型架優點

1. 造型架由鋁合金及不同密度塑膠物料製造，重量只為0.4公斤/0.8磅，輕巧耐用，易於清洗。
2. 纖薄貼身，病人容易自行穿戴。
3. 度身訂做，減少病人穿戴期間的不適感，亦不會妨礙女性胸部發育。



4. 安全可靠（獲美國食品及藥物管理局FDA註冊）。
5. 進行一般運動時亦可穿戴。
6. 效果快（於兩個月內有顯著效果）。

► 胸廓造型架的原理，是利用壓力將胸骨向內推，重回正常位置。

▲ 高級物理治療師羅家儀說，患者或有需要進行改善肌肉強度訓練及加強軟組織柔韌性。

周志平醫生指出，胸廓造型架非常貼身，所以穿上外衣後也難以察覺，而患者穿上造型架時亦可以做輕量運動，包括一般學校體育課，不會影響正常生活。

「基本上這個造型架需二十四小時佩戴，除了洗澡時脫下外，其餘時間都應戴上。如需進行一些較劇烈的運動，例如出席陸運會或水運會等則宜脫下，以免妨礙呼吸。」梁永健說。

造型架所以能發揮效用，主要是因為青少年的肋骨尚未完全骨化，仍然柔軟，故有可塑性。如果患者在十歲以下，治療效果會更顯著。而治療期間，矯形師會密切監察治療進度，並相應調整造型架。如患者依從醫護人員指

戴造型架，他說除了治療首星期會當天穿了一般青少年的時尚衣飾，從外觀上完全不察覺他已穿戴造型架，他說除了治療首星期